

## Publikationen mit Beringungsergebnissen der Jahre 2010 und 2011

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee-Ergebnisse wie auch solche anderer Beringungszentralen mit Bezug auf Ostdeutschland ein. Die Liste für die Jahre 2010 und 2011 enthält zahlreiche Nachträge von Publikationen, die bereits in vorangegangenen Jahren erschienen sind. Bei aller Unterschiedlichkeit der Formate, Darstellungsweisen und wissenschaftlichen Ansprüche der aufgenommenen Artikel widerspiegelt diese Liste recht gut die aktuellen Anwendungsfelder der Beringungsmethode in Deutschland und Europa. Sie belegt damit das nach wie vor ganz unschätzbare Potenzial der Methode für diverse Fragestellungen der modernen ornithologischen Forschung. Aus ostdeutscher Perspektive dient sie auch dem Leistungsnachweis von Beringern und Beringungszentrale und soll daher nicht zuletzt zu eigener Publikationstätigkeit anregen.

- AKOOS (Hrsg.) 2011: Ornithologischer Jahresbericht 2010 Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale. Schönbrunn.
- BAI, M.-L., & D. SCHMIDT 2011: Differential migration by age and sex in central European Ospreys *Pandion haliaetus*. J.Ornithol.:
- BALMER, J. & J. BLANK 2009: Spechte im Nationalpark Hainich – Fang, Beringung und Wiederfunde von 2002 bis 2009. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 57-62.
- BELLEBAUM, J., GRIEGER, C., KLEIN, R., KÖPPEN, U., KUBE, J., NEUMANN, R., SCHULZ, A., SORDYL, H. & H. WENDELN 2008: Ermittlung artbezogener Erheblichkeitsschwellen von Zugvögeln für das Seegebiet der südwestlichen Ostsee bezüglich der Gefährdung des Vogelzuges im Zusammenhang mit dem Kollisionsrisiko an Windenergieanlagen. Abschlußbericht. Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (FKZ 0329948). Neu Broderstorf.
- BUCHHEIM, A. 2010: Die Altersbestimmung der drei hellmanteligen Großmöwenarten Silbermöwe *Larus argentatus*, Steppenmöwe *L. cachinnans* und Mittelmeermöwe *L. michahellis*. Limicola 24: 287-326.
- CLARK, J.A., ROBINSON, R.A., DU FEU, C., WRIGHT, L.J., CONWAY, G.J., BLACKBURN, J.R., LEECH, D.I., BARBER, L.J., DE PALACIO, D., GRIFFIN, B.M., MOSS, D. & S. SCHÄFER 2010: Bird ringing in Britain and Ireland 2009. Ringing & Migration 25: 88-127.
- DÄMMIG, M. 2007: Bestandsentwicklung der Wasseramsel *Cinclus cinclus* am Lockwitzbach bei Dresden. Actitis 42: 59-72.
- DIERSCHKE, J., DIERSCHKE, V., HÜPPOP, K., HÜPPOP, O. & K.F. JACHMANN 2011: Die Vogelwelt der Insel Helgoland. OAG Helgoland. Helgoland.
- DITTBERNER, W. 2010: Die Tüpfelralle (*Porzana porzana*) im Nationalpark Unteres Odertal. Otis 18: 77-81.
- DITTBERNER, W. 2010: Die Weidenmeise *Parus montanus* im Nationalpark Unteres Odertal. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 61-74.
- EGGERS, U. SCHULZ, H, SCHULZ, F., FREULING, C., HLINAK, A., MÜHLE, R.-U. MÜLLER, T. & D. WALLSCHLÄGER 2010: Möglichkeiten interdisziplinärer Forschung zur Biologie der Vögel: Das „Paradebeispiel“ Weißstorch *Ciconia ciconia* – Untersuchungen in der Prignitz, Brandenburg. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 15-26.
- FISCHER, B. & R. MARTIN 2010: 10 Tage Vogelzug auf der Greifswalder Oie im Oktober 2009 – ein Beobachtungsbericht. Seevögel 31: 17-18.
- FIUCZYNSKI, D. & P. SÖMMER 2011: Der Baumfalke. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 575. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.
- GERBER, A., LEUTHOLD, W. & M. KERY 2011: Der Bienenfresser *Merops apiaster* in der Schweiz: Durchzug und Bruten. Ornithol. Beob. 108: 81-100.
- GÖRNER, M. & H.-G. BENECKE 2011: Die Bedeutung von Sanddorn (*Hippophae rhamnoides*) für Vögel. Acta ornithoecologica 7 (1/1): 53-94.

- HENNE, E. & B. BLAHY-HENNE 2010: Die Mauser der Hand- und Armschwingen beim Kranich *Grus grus*. Vogelwelt 131: 107-110.
- HERRMANN, C., KRONE, O., STJERNBERG, T & B. HELANDER 2009: Population Development of Baltic Bird Species: White-tailed Sea Eagle (*Haliaeetus albicilla*). HELCOM Indicator Fact Sheet. URL: [http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2009/en\\_GB/White-tailedSeaEagle/](http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2009/en_GB/White-tailedSeaEagle/) (zuletzt aufgerufen 1.4.2010).
- HERRMANN, R. 2011: Naturschutzargumente durch Weißstorch-MonitoRing. Vogelwarte 49: 322.
- HERRMANN, S. & K. KÜHNE 2010: Zur Variabilität des zentralen Kehlflecks beim Weißsternigen Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneola*. Apus 15: 29-38.
- HERRMANN, W. 2011: Erste Ergebnisse zehnjähriger Untersuchungen zur Brutbiologie der Schleiereule (*Tyto alba Scopoli 1769*) in der Umgebung von Dessau (Sachsen-Anhalt). Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau – Mittelelbe und angrenzende Landschaften.
- Hofer, J., Korner-Nievergelt, P. & F. Korner-Nievergelt 2010: Auftreten und Herkunft der Wasservögel am Sempachersee. Ornithol. Beob., Beiheft 11.
- ILLIG, K. & P. SCHONERT 2011: Weitere 10 Jahre Weißstorchfassung im Altkreis Luckau (2001 – 2010) mit Rückblick auf 50 Jahre. Biol. Studien Luckau 40: 53-74.
- ITONAGA, N. 2009: White storks (*Ciconia ciconia*) of Eastern Germany: age-dependent breeding ability and age- and density-dependent effects on dispersal behaviour. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam. [http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3905/pdf/itonaga\\_diss.pdf](http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3905/pdf/itonaga_diss.pdf)
- ITONAGA, N., KÖPPEN, U., PLATH, M. & D. WALLSCHLÄGER 2010: Breeding dispersal directions in the white stork (*Ciconia ciconia*) are affected by spring migration routes. J. Ethol. 28: 393-397.
- ITONAGA, N., KÖPPEN, U., PLATH, M. & D. WALLSCHLÄGER 2011: Declines in breeding site fidelity in an increasing population of White storks *Ciconia ciconia*. Ibis 153: 636-639.
- JUNGHANN, C. 2004: Auswertung von Beringungsdaten vom Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in der Prignitz. Staatsexamensarbeit, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam.
- KÄSTNER, S. 2009: Erstnachweis und erfolgreiche Brut eines Hybriden Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) x Mehlschnalbe (*Delichon urbicum*) an der Oberen Saale. In: AKOOS (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des AKOOS 6: 47 -52.
- KÄSTNER, S. 2009: Vorkommen und Brutbiologie des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*) im Gebiet der Oberen Saale. In: AKOOS (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des AKOOS 6: 33-46.
- KLEINSTÄUBER, G., SÖMMER, P. & W. KIRMSE 2010: Zum heutigen Stand des Wiederaufbaus von Populationen des Wanderfalken (*Falco p. peregrinus*) in Ostdeutschland und zu neuen Erkenntnissen aus dem langjährigen Projekt der Farb- und Kennberingung ostdeutscher Wanderfalken. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 341-353.
- KÖPPEN U. & S. SCHEIL 2010: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 2009. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 115-143.
- KÖPPEN, U. & S. SCHEIL 2009: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 2008. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 81-106.
- KÖPPEN, U., SCHIMKAT, J. & C. KAATZ 2010: Bessere Einschätzung des Erhaltungszustandes von Populationen durch Integriertes Monitoring – das Beispiel Weißstorch *Ciconia ciconia* in Ostdeutschland. In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. Bonn - Bad Godesberg.
- KORNER-NIEVERGELT, F., SAUTER, A., ATKINSON, P.W., GUÉLAT, J., KANIA, W., KERY, M., KÖPPEN, U., ROBINSON, R.A., SCHAUB, M., THORUP, K., VAN DER JEUGD, H., & A.J. VAN NOORDWIJK 2010: Improving the analysis of movement data from marked individuals through explicit estimation of observer heterogeneity. J. Avian Biol. 41: 8-17.

- KROLL, S. & H. ZÖLLICK 2010: Beringung von Weißstörchen im Raum Rostock – erste Ergebnisse. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 99-102.
- KÜHN, S. 2010: Weißstorchdaten für die Prignitz-Daten und erste Auswertungen. Masterarbeit, Universität Potsdam.
- LANGGEMACH, T. 2011: Die letzten Großtrappen in Deutschland. Seevögel 32: 15-17.
- MÄDLOW, W. 2010: Brutzeiten von Wiesenvögeln in Ostdeutschland - eine Auswertung von Beringungsdaten. Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2010, S. 103-107.
- MÄHLER, M. & J. VON RÖNN 2010: Der Gartenrotschwanz.- Vogel des Jahres 2010 – auf der Greifswalder Oie. Seevögel 31: 98-99.
- MÄHLER, M. 2010: Frühling, Sommer, Herbst und Sommer – Das Jahr eines Zugvogels. Rückblick auf das Beringungsjahr 2010 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 31: 100-103.
- MÄHLER, M. 2010: Rückblick auf das Beringungsjahr 2009 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 31: 19-21.
- MÄHLER, M. 2011: Rückblick auf das Beringungsjahr 2011 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 32: 109-112.
- MAMMEN, U., MAMMEN, K., STARBER, K. & A. RESETARITZ 2010: Rotmilan und Windkraft – eine Fallstudie in der Querfurter Platte. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 223-231.
- MEISTER, B. & U. KÖPPEN 2010: Dreizehn Jahre Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) in Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 87-92.
- MEWES, W. & M. RAUCH 2010: Die Identifizierung brütender Kranichweibchen *Grus grus* anhand Ihrer Gelege. Vogelwelt 131: 93-102.
- MEYBURG, B.-U. & C. MEYBURG 2010: GPS-Satelliten-Telemetrie bei einem adulten Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Aufenthaltsraum während der Brutzeit und Überwinterung. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 243-284.
- MEYER, W. & M. MELLE 2010: Mehr als drei Jahrzehnte Untersuchungen am Rauhfußkauz *Aegolius funereus*- Beobachtungen bei der praktischen Arbeit. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 75-82.
- MEYER, W. 2010: Zum Wanderungsverhalten des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* auf der Grundlage von Beringungsergebnissen aus Thüringen. Vortrag auf der 25. Jahrestagung der AG Eulen, Sebnitz 2009, Zusammenfassung. Eulen-Rundblick 60: 35-36.
- MEYER, W. 2010: Zum Wanderverhalten des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* auf der Grundlage von Beringungsergebnissen aus Thüringen. Anz. Ver. Thür. Orn. 7: 85-93.
- MÜHLE, R.-U., EGGERS, U., WALLSCHLÄGER, D., MÜLLER, T., KRAMER, M., FREULING, C., CONRATHS, F. J., BILK, S., HLINAK, A. & T. HARDER 2009: Bedeutung von Rastplätzen für die Verbreitung von aviären Infektionen bei Zugvögeln am Beispiel des Ramsar-Gebietes Untere Havelniederung. Beitr. Jagd u. Wildforschung 34: 127-137.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH 2009: Beringungsarbeit erbringt entomologisch wertvolle FFH-Libellen- Nachweise in Nahrungsresten. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 69.
- MÜLLER, J. 2009: Die weißen Flecken in den Schwanzfedern der Rauchschnalben *Hirundo rustica* und deren Brauchbarkeit zur Geschlechtsbestimmung. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 65-68.
- MÜLLER, J. 2009: Farbvarianten junger Bienenfresser *Merops apiaster*. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 43-46.
- MÜLLER, J. 2009: Jahresbericht 2008 zur Vogelberingung. halophila, Mitt.-Bl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt Nr. 53: 2-4.
- MÜLLER, J., J. LOTZING & R. STEGLICH 2006: Zu Nahrungsökologie und Brutbiologie der Rauchschnalbe *Hirundo rustica*. – Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: 101-108.
- NACHTIGALL, W., HEROLD, S. & U. KÖPPEN 2010: Zusatzmarkierungen von Seeadlern in Ostdeutschland – ein Überblick. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 93-98.
- NEHLS, H. W. 2009: Wiederfunde in der Labradorsee beringter Elfenbeinmöwen *Pagophila eburnea*. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 53-56.

- Neubauer, W. 2010: Zwei 27-jährige Flußseeschwalben. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 85-86.
- NOWALD, G. 2010: Colour marking and radio-tracking of Common Cranes *Grus grus* in Germany and Europe – an overview. Vogelwelt 131: 111-116.
- OLSZEWSKI, A & A. TARLOWSKI 2008: Bocian biały z wyjątkowym rodowodem. Kraska 16 (1-2): 40-41.
- PFEIFFER, T. 2010: Untersuchungen zur Altersstruktur von Brutvögeln beim Rotmilan (*Milvus milvus*). In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 197-210.
- PROBST, R. & B. STRUWE-JUHL 2011: Die Kleider des Sdeeblers *Haliaeetus albicilla* unter dem Einfluß individueller und geografischer Variation. Limicola 25:169-194.
- ROST, F. 2009: Das Zugverhalten europäischer Mönchgrasmücken *Sylvia atricapilla* im Wandel – Daten aus Ostdeutschland 1964 – 2007. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 21-36.
- ROST, F. 2009: Heckenbraunelle *Prunella modularis*, Rotkehlchen *Erithacus rubecula* und Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* in Thüringen: eine Analyse des Beringungs- und Wiederfundmaterials der Vogelwarte Hiddensee, ergänzt durch Feldbeobachtungen. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 6: 253-270.
- SCHEIDER, J., WINK, M. WILTSCHKO, W. & M. STUBBE 2010: Zur Phylogenie und Taxonomie der Schwarzmilan-Subspezies. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 233-241.
- SCHIMKAT, J. 2011: Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Vogelwarte 49: 324-325.
- SCHMIDT, D. 2009: 15 Jahre Farbberingung von Fischadlern *Pandion haliaeetus* in Deutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 47-52.
- SCHMIDT, D. 2011: Rückkehr nach vielen Jahrzehnten: Fisch- und Seeadler in Süddeutschland. Der Falke 58 (Sonderheft): 22-41.
- SCHMIDT, K. 2010: Veränderungen von Bestand, Reproduktion und Zugverhalten der Weißstörche *Ciconia ciconia* in der Werraue (Westthüringen). Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 7-14.
- SCHÖNFELD, M. & H.-J. KAPISCHKE 2010: Zur Schreckmauser von Kleinvögeln, speziell Baumläufern *Certhia spec.* nach Befunden. Ornithol. Mitt. 62: 232-235.
- SCHÖNFELD, M. 2008: Verhaltensweisen und Lautäußerungen der Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) bei syntopem Vorkommen im Mittelgebirgsgebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Vertebrate Zoology 58(1): 93-112.
- SCHÖNFELD, M. 2010: Abriß zur wissenschaftlichen Vogelberingung im Altkreis Wittenberg. Apus 15: 51-64.
- SCHÖNFELD, M. 2011: Zur Längendifferenz der Steuerfedern von Wald- und Gartenbaumläufer *Certhia familiaris* u. *S. brachydactyla* im Jahreslauf. Orn. Mitt. 63: 280-285.
- SCHÖNFELD, M. 2011: Zur Schreckmauser bei Kleinvögeln nach Befunden. Orn. Mitt. 63: 172-185.
- SCHREY, E. & C. Vieth 2011: Großtrappe auf Neuwerk – Die Geschichte einer Winterflucht. Seevögel 32: 13-14.
- SCHULZ, F. 2011: Storchenland Prignitz. Vogelwarte 49: 327.
- SCHWARZE, E. 2011: Zum Winteraufenthalt der Wasserramsel *Cinclus cinclus* im Flachland von Sachsen-Anhalt. Apus 16: 22-28.
- SIEFKE, A. 2011: Studien an einer farbberingten Sandregenpfeiferpopulation (*Charadrius hiaticula*) I. Zum Einfluss der Prädation auf Reproduktion und Bestand. Acta ornithoecologica 7 (1/1): 15-52.
- STEIN, H. & U. BARTELS 2010: Brutplatz- und Partnertreue an einem neu besiedelten Brutplatz des Blaukehlchens *Luscinia svecica cyanecula* in Sachsen-Anhalt und Anmerkungen zum Gefieder. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 55-60.
- STEIN, H. 2009: Fangstatistik und Analyse der Körpermasse von Amseln *Turdus merula* in einem ländlichen Raum bei Magdeburg im Herbst und Winter. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 7-20.

- STUBBE, M., STUBBE, A., BATSAJCHAN, N., GOMBOBATAAR, S., STENZEL, T., VON WEHRDEN, H., BOLDBATAAR, SH., NYAMBAYAR, B., SUMJAA, D., SAMJAA, R., CEVEENMJADAG, N. & A. BOLD (†) 2010: Brutareale und Brutbiologie der Greifvogelarten der Mongolei. In: STUBBE, A., KACZENSKY, P., WESCHE, K., SAMJAA, R., STUBBE, M. & R. P. READING (Hrsg.): Erforschung Biologischer Ressourcen der Mongolei, Band 11. Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, Halle (Saale). S. 23-177.
- STUBBE, M., STUBBE, A., WEBER, M., KRATZSCH, L., RESTARITZ, A., HERRMANN, S., MAMMEN, U., MAMMEN, K. & H. ZÖRNER 2010: Erste Ergebnisse der Sichtmarkierung von Greifvogelarten in Sachsen-Anhalt. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 153-165.
- SULAWA, J., ROBERT, A., KÖPPEN, U., HAUFF, P. & O. KRONE 2010: Recovery dynamics and viability of the white-tailed eagle (*Haliaeetus albicilla*) in Germany. *Biodiversity and Conservation* 19: 97-112.
- TAUCHNITZ, H. 2009: Bienenfresser *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt – bemerkenswerte Beobachtungen bei Fang und Kontrolle am Brutplatz. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 19: 37-42.
- TAUCHNITZ, H. 2011: Vogelfang, Vogelberingung und Vogelfänger in Halle. *Apus* 16 (SH): 57-78.
- TETZLAFF, F. 2010: Zehn Jahre Beringung von Saatkrähen *Corvus frugilegus* im Tierpark Greifswald – eine kurze Bilanz. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 20: 27-35.
- THOMZICK, P. 2010: Der Weißstorch- Bestandsentwicklung 1994 bis 2009 und Schutzprobleme im Landkreis Güstrow. Stirbt der Weißstorch aus? *Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern* 53: 51-57.
- TODTE, I. 2010: Beringung und Wiederfunde von in Ostdeutschland vorkommenden BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica cyanecula* und Schwarzkehlchen *Saxicola rubecula*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 20: 36-54.
- TÖPFER, T. 2010: Modern avifaunistic research with old specimens: the importance of avian rarities as vouchers in ornithological collections. *Proc. 5th Int. Meet. Europ. Bird Curators. Nat. Hist. Mus. Vienna*,: 209–218
- ULBRICHT, J. , NACHTIGALL, W. & M. ZISCHEWSKI 2009: Zwei seltene Gäste in der Oberlausitz: Zwergohreule (*Otus scops*) und Schwalbenmöwe (*Xema sabinii*). *Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz*. 29: 83-86.
- WALLSCHLÄGER, D. & U. KÖPPEN 2011: Ringfundauswertung zum Weißstorch *Ciconia ciconia* aus dem Monitoringprogramm Klimawandel. *Vogelwarte* 49: 323.
- WALLSCHLÄGER, D. & L. JAWORSKI 2011: Ausgewählte Ergebnisse aus zehn Jahren Trauerschnäpperforschung *Feicedula hypoleuca* im Potsdamer Park Sanssouci. *Vogelwarte* 49: 310.
- WEIßGERBER, R. 2011: Vogelwarte Hiddensee – ein Beispiel für den „Abbau Ost“? *Orn. Mitt* 63: 64-66.
- WEIßGERBER, R., SMYK, G. & H. GEHLHAAR 2009: Zur Effizienz von zwei Biotopen (Sanddornhecke, Pappel-Birken-Gehölz) als Nahrungsreservoir für Vögel in der mitteldeutschen Tagebaufolgelandschaft. *Anz. Ver. Thüring. Ornithol* 6: 287 – 294.
- WIESNER, J. 2010: Helferweibchen beim Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*. *Charadrius* 46: 65-68.
- WINK, M., BECKER, D., TOLKMITT, D., KNIGGE, V. SAUER-GÜRTH, H. & H. STAUDTER 2011: Mating system, paternity, and sex allocation in Eurasian Wrynecks (*Jynx torquilla*). *J. Ornithol.* 152: 983-989.